

# Белимуаб при системной красной волчанке в реальной клинической практике в России

Елонаков  
Александр Викторович

ГБУЗ Московской области  
МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского  
Симпозиум

«Перспективы терапии системной красной волчанки:  
реальная клиническая практика»

16 октября 2014 года, Москва

Выступление спонсируется ГлаксоСмитКляйн. Информация, включенная в данную презентацию,

отражает мнение автора и может не совпадать с позицией ГлаксоСмитКляйн.

Компания ГлаксоСмитКляйн не несет никакой ответственности за любые возможные нарушения авторских прав и иных прав третьих лиц в результате публикации и распространения данной информации





Представлены предварительные данные об эффективности и безопасности белимумаба, полученные в реальной клинической практике в Московской области у 5 пациентов как минимум в течение 12 мес.

Всего в настоящее время терапию белимумабом получает 10 пациентов с СКВ.

женщин

4

мужчин

1

возраст

31 – 63 года,

средний возраст

42,4 года

длительность заболевания

4 – 19 лет



# Пациенты (n=5)

	Исходно	Через 12-14 мес. лечения белимумабом
Количество пациентов, получающих препарат в течение 12 мес. более	5	
SELENA-SLEDAI	10,8 (7-20)	1,06* (0,1-1,95)
Протеинурия , г/сут (n=3)	0,76 (0,1-1,95)	0,1 (0,1-0,2)
Доза ГК, мг/сут	7,5 (5-7,5)	3,75 (3,75-6,25)
PGA	3,2 (1-6)	1,0 (1-4)
Негативные побочные эффекты (инфекции, реакции гиперчувствительности)		Не отмечалось


\* Без повторного определения титра АНА и С3,С4

# Клинический пример 1, КЕБ, ж., 31 года, 54 кг

	Исходно	Через 14 мес. лечения Белимуабом + станд. тер.
Диагноз	СКВ, подострого течения, полиартрит, поражение кожи, нефрит, анемия.	
<b>Стандартная терапия</b>		
Преднизолон, мг/сут	5,0	3,75
ММФ, мг/сут	1000	
Плаквенил, мг/сут	400	200

# Клинический пример 1, КЕБ, ж., 31 года, 54 кг


Динамика индекса активности  
SELENA-SLEDAI на фоне терапии  
Белимумабом + стандартная терапия\*



\* Без повторного определения титра АНА и С3, С4

# Клинический пример 1, КЕБ, ж., 31 года, 54 кг

Динамика протеинурии на фоне терапии Белимумабом




# Клинический пример 2, КВС, м., 63 года, 84 кг

	Исходно	Через 12 мес. лечения Белимумабом + станд. тер.
Диагноз	СКВ, артралгии, плеврит, пневмонит, перикардит. АФС (тромбоз почечной артерии, ОНМК, венозные тромбозы (почечной вены, вен н.конечностей)	
<b>Стандартная терапия</b>		
Преднизолон, мг/сут	7,5	6,25
Азатиоприн, мг/сут	150	150
Плаквенил, мг/сут	400	200

# Клинический пример 2, КВС, м., 63 лет, 84 кг


SELENA-SLEDAI на фоне терапии  
Белимумабом + стандартная терапия\*



\* Без повторного определения титра АНА и С3, С4

# Клинический пример 2, КВС, м., 63 года, 84 кг

Динамика протеинурии на фоне терапии Белимумабом



# Выводы

- На фоне лечения белимумаба в сочетании со стандартной терапией в наблюдаемой группе пациентов (n=5) имелась тенденция к положительной динамике в течении СКВ:
  - отсутствие случаев обострений СКВ
  - снижение индекса SELENA-SLEDAI (клинические и часть лабораторных показателей)
  - уменьшение дозы глюкокортикоидов (до относительно безопасных значений <7,5 мг/сут)
  - снижение показателя PGA (общая оценка врачом состояния пациента)
- Препарат хорошо переносится
  - отсутствие случаев реакций гиперчувствительности, инфекций и других негативных побочных эффектов
- Накопленный, хотя и небольшой, клинический опыт позволяет надеяться на перспективы применения препарата в качестве биологической терапии СКВ