

Русскоязычная версия Easy-BILAG (Easy-the British Isles Lupus Assessment Group – облегченный индекс Группы оценки волчанки на Британских островах) [21]

Ключ

	A
	B
	C
Все	D
Все	E

предыдущий

никогда

СИМПТОМЫ (ПУНКТ)

СОКРАЩЕННЫЙ ГЛОССАРИЙ

Кожно-слизистые	Кожные высыпания <i>тяжелой степени</i>	Любая волчаночная сыпь, кроме панникулита, буллезного поражения и ангионевротического отека с вовлечением >18% ППТ	0	1	2	3	4			
	Кожные высыпания <i>легкой степени</i>	Как указано выше, но <18% ППТ. При скуловой сыпи: наблюдаются врачом и присутствуют по крайней мере неделю	0	1	2	3	4			
	Изъязвление слизистых <i>тяжелой степени</i>	Ограничивающее функцию (значительно затрудняющее прием внутрь), обширное и глубокое. Наблюдается врачом	0	1	2	3	4			
	Изъязвление слизистых <i>легкой степени</i>	Локализованное и/или не ограничивающее функцию изъязвление	0	1	2	3	4			
	Алоpecia <i>тяжелой степени</i>	Обнаруживаемое клинически (диффузное или гнездное) выпадение волос с воспалением / покраснением кожи головы	0	1	2	3	4			
	Алоpecia <i>легкой степени</i>	Диффузное или гнездное выпадение волос без воспаления кожи головы (обнаруживается клинически / по анамнезу)	0	1	2	3	4			
	Дигитальные инфаркты/узелковый васкулит	Локализованные одиночный /множественные инфаркт (ы) пальцев или болезненные эритематозные узелки	0	1	2	3	4			
	Периунгуальная эритема / ознобление	Ознобление – локализованное воспалительное поражение (с возможным изъязвлением), вызванное воздействием холода	0	1	2	3	4			
	Другие проявления	Ангионевротический отек, панникулит, кожный васкулит или оскольные кровоизлияния	Нет	ДА → следующая страница						
МСК	Артрит <i>тяжелой степени</i>	Наблюдаемые синовит ≥2 суставов + значимое снижение объема движений и повседневной активности в течение нескольких дней за последние 4 нед	0	1	2	3	4			
	Артрит <i>средней степени, тендинит или теносиновит</i>	≥1 сустав (при осмотре /в анамнезе), умеренное снижение объема движений в течение нескольких дней за последние 4 нед	0	1	2	3	4			
	Артрит <i>легкой степени, артралгии или миалгии</i>	Воспалительная боль в суставах/мышцах	0	1	2	3	4			
	Другие проявления	Миозит	Нет	ДА → следующая страница						
Сердечно-легочные	Плеврит/перикардит	Убедительные физикальные данные и/или данные анамнеза. Не заполняйте, если не уверены	0	1	2	3	4			
	Плевральный выпот и одышка	Требуется инструментальное подтверждение	0	1	2	3	4			
	Интерстициальный альвеолит/пневмонит	Требуется инструментальное подтверждение. Скорректированный Ксо <70% нормы или снижение на >20%	0	1	2	3	4			
	Другие проявления	Любые другие кардиореспираторные проявления СКВ	Нет	ДА → следующая страница						
Нейро-психиатрические	Мононевропатия (одиночная или множественная)	Требуется электронейрографическое подтверждение	0	1	2	3	4			
	Полиневропатия	Острый симметричный дистальный чувствительный и/или двигательный дефицит (инструментально подтвержденный)	0	1	2	3	4			
	Судорожное расстройство	Независимое описание судорожного синдрома надежным свидетелем	0	1	2	3	4			
	Другие проявления	Любые другие нейропсихиатрические проявления СКВ	Нет	ДА → следующая страница						
Гематологические	Общий анализ крови	Обведите значения только в случае, если это связано с активностью СКВ, исключая лекарственные причины, дефицит железа и т.д.	Гемоглобин, г/л	БЕЗ признаков гемолиза	Никогда	>109	80-109	<80		
			С признаками гемолиза	Никогда		>100	80-99	<80		
			Лейкоциты, x10 ⁹ /л	Никогда	>3.9	1-3.9	<1.0			
			Нейтрофилы, x10 ⁹ /л	Никогда	>1.9	0.5-1.9	<0.5			
			Лимфоциты, x10 ⁹ /л	Никогда	>1.0	<1.0				
	Тромбоциты, x10 ⁹ /л	Никогда	>149	50-149	25-49	<25				
	Другие проявления	Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура или изолированная позитивная проба Кумбса	Нет	ДА → следующая страница						
Желудочно-кишечные		Офтальмологические								
Если есть → следующая страница		Если есть → следующая страница								

Для следующих систем обведите все применимое и суммируйте баллы, чтобы определить оценку домена

Общие

A	≥1200
B	≥200
C	≥10
D	0
E	0

предыдущий

никогда

Конституциональные

	Лихорадка	Задокументированная температура тела >37.5 °C (инфекции исключены)	0	10	1000	1000	1000	
	Потеря веса	Непреднамеренная потеря веса >5% в течение 1 мес в связи с СКВ	0	10	100	100	100	
	Лимфаденопатия или спленомегалия	Лимфатический узел >1 см в диаметре	0	10	100	100	100	
	Анорексия	В связи с активностью СКВ	0	10	100	100	100	

Почечные

	Выберите все, что применимо:	Нефробиопсия за последние 3 мес?	1000	Активный мочевой осадок?	1000	Нефротический синдром?	100	
	Отношение белок/креатинин в моче, мг/ммоль или эквивалент. Выбрать 1:	25-50 или >25 и улучшение на ≥25%	1	50-100 и без улучшения	10	>100 и без улучшения	1000	
	СКФ, мл/мин/1.73м ² . Выбрать 1:	<80 мл/мин и <67% от предыдущего	100	<50 мл/мин и предыдущий >50		100		
	Креатинин сыворотки. Выбрать 1:	>130 мкмоль/л и >130% от предыдущего	100	>130 мкмоль/л и >115% предыдущий		10		
	АД, мм.рт.ст.	Повышение АД (↑ до >170/110 в течение месяца с изменениями сетчатки)	100	АД >140/90 и ↑ на 30 САД или 15 ДАД		1		

Обновите итоговые оценки доменов с помощью выбора элементов на странице 2

Больше нет симптомов? BILAG ЗАПОЛНЕН

